sente espèce se rapproche de l'*Atelopsalis tricuspis*, Trt., récemment dragué, à de grandes profondeurs, dans le golfe de Gascogne par M. Kœhler.

Habitat. — Bahia de Caldera à Santiago (Chili), sur des Algues rouges, par M. F. Lataste.

5. **Halacarus spinifer**, var. *affinis*, n. var. (de la Méditerranée). — Cette variété ne diffère du type de l'Océan que par une taille un peu plus faible et la forme des gros poils des pattes antérieures qui, au lieu d'être en forme de clous, avec la pointe émoussée, sont *plus grêles et se terminent par une pointe longue et effilée*. — Marseille (pointe de Morgiou), par M. Marius Aubert; Villefranche, par M. Chevreux, sur les Corallines de la zone littorale. Comme le type, l'adulte ne se montre qu'en hiver.

6. **Halacarus** (**Leptospathis**) **Chevreuxi**, Trt. — Les spécimens dragués par M. Kœhler à La Ciotat sont remarquables par le grand développement des lamelles des pattes, développement comparable à celui des mêmes organes sur *H. nationalis*. Du reste, on trouve déjà, dans la Manche et dans l'Océan, des individus à lamelles très développées, et dans les mêmes localités des individus à lamelles presque nulles. Le même fait s'observe dans la Méditerranée.

Il est donc impossible de baser sur ce caractère la distinction des espèces et des variétés, aussi longtemps, du moins, que l'on ne connaîtra pas la cause de ces différences.

Descriptions de Lépidoptères nocturnes, *par* Paul Thierry-Mieg.

Sabulodes nivisparsa, n. sp. — ♂ 39 mill. — Antennes filiformes, couleur café au lait, pointillées de noir. Bord externe des ailes supérieures avec un angle très obtus sur la première branche de la médiane.

Ailes supérieures café au lait pâle, finement pointillées de noir. De la côte, à 5 mill. de la base, part une ligne en zigzag formant deux angles à pointes dirigées en dehors, et aboutissant au bord interne, à 6 mill. de la base. Cette ligne est vert-pomme, éclairée de blanc à l'intérieur et de noir en dehors. Une ligne, brune d'abord, puis noirâtre, presque droite, part de la côte à 6 mill. de l'apex et vient finir au bord interne à 6 mill. de l'angle interne. Enfin une ligne noire, éclairée de vert-pomme en dehors, part de la côte, à 3 mill. de l'apex.

Elle est d'abord en zigzag, longe une partie de la sous-costale, et ensuite vient longer la ligne noire dont je viens de parler, jusqu'au bord interne. Le bord externe est verdâtre près de l'apex, le reste brun café, avec deux bandes blanches, la première étroite, en zigzag, la deuxième plus large, longeant la ligne verte. Frange café au lait, brun noirâtre aux nervures, et blanche à l'angle externe.

Ailes inférieures blanches, à angle anal coupé carrément, avec une fine bande grise au bord externe, deux traits noirs au bord abdominal, à 4 mill. de l'angle anal, sur lequel se trouvent des petits points café au lait. Frange blanche au bord abdominal, puis brune jusqu'au milieu du bord externe, et enfin blanche entrecoupée de brun. Le dessous des ailes rappelle un peu celui de *Sabulodes glaucularia*. Snell. Dessous des supérieures blanc, lavé de café au lait très pâle à la côte, d'où part, avant l'apex, une large tache brune, suivie d'une noire sur l'indépendante. Une ligne transverse de points nervuraux noirs part de près de l'apex et s'éloigne du bord externe vers la fin de son parcours. Bord externe blanc à l'apex, puis noirâtre. La frange paraît double. La partie extérieure est brune, la partie intérieure blanche entrecoupée de brun. Frange de l'angle interne blanche. Dessous des inférieures blanc lavé de café au lait très pâle, avec une ligne transverse de points nervuraux noirs, partant de la côte près de l'apex et finissant près du bord abdominal, par un trait noir, à 5 mill. de l'angle anal. Frange blanche entrecoupée de brun, avec un liséré extérieur brun près de l'angle anal..

Dessous des quatre ailes pointillé de noir. Un point cellulaire noir aux quatre ailes, dessus et dessous: il est plus fort aux supérieures.

Dessus du thorax et de l'abdomen café au lait clair, dessous et pattes café au lait très clair, ces dernières pointillées de noir.

Bolivie. — 1 ♂. Ma Collection.

Scordylia lacrymosa, n. sp. — ♂ 22 mill. — Antennes noires, filiformes. Coupe d'ailes de *Scordylia fidoniata*. Stgr.

Ailes supérieures noires, avec des écailles bleu pâle et blanches à la base, formant des lignes irrégulières, une petite tache blanche au milieu du bord interne, et la côte ornée de litures blanches, plus ou moins fortes.

Ailes inférieures blanches, avec un point central noir, le bord abdominal bordé de noir et une bande noire de 3 mill. garnissant tout le bord externe. Frange des quatre ailes noire entrecoupée de blanc.

Dessous des supérieures noir, avec du blanc à la côte, une grande tache ronde, bistre, éclairée de blanc, à l'apex, une ligne blanchâtre

sur l'angle interne et un espace blanc bleuâtre sur le milieu du bord interne. Frange blanche entrecoupée de noir, puis de brun à l'apex.

Dessous des inférieures blanches, avec des espaces noir et ocre à la base, et une bande externe de 3 mill., brune près de l'apex, puis noire, et enfin rose striée de noir à l'angle anal. Frange comme aux supérieures.

Dessus du corps noir cerclé de blanc, dessous blanc, pattes entrecoupées de brun et de blanc. Palpes noirs, blancs en dessous.

Bolivie. — 2 ♂. Ma Collection.

Scordylia (?) **Rosgala**, n. sp. — ♂ 18 mill. — Antennes jaunes annelées de noir, finement crénelées.

Ailes supérieures noires, avec une tache jaune vif à l'apex, et tout l'espace basilaire (sauf la côte) blanc légèrement jaunâtre. Cet espace blanc se termine au bord interne à 2 mill. de l'angle interne

Ailes inférieures blanches, de la base jusqu'au milieu de l'aile, et le reste noir.

Dessous des ailes conforme au dessus, mais la tache jaune de l'apex des supérieures est double de taille et la côte à la base est striée de jaune. Frange noire aux quatre ailes, dessus et dessous. Palpes très fins, jaunes avec l'extrémité noire. Pattes jaunâtres, pointillées de noir; dessous de l'abdomen blanc. Cette espèce, très fine, se rapproche un peu des *Cidaria*.

Bolivie. — 2 ♂. Ma Collection.

Note sur trois Coléoptères de la Collection de M. R. Oberthür, par L. Fairmaire.

Le premier est une espèce nouvelle du g. *Discoptera*, qui n'a été encore signalé qu'au Turkestan et en Boukharie; celle-ci provient de l'Hedjaz.

Discoptera arabica, n. sp. — Long. : 9 mill. — Ovale, à peine convexe, d'un roux testacé brillant, plus clair sur la moitié externe des élytres; corselet large, fortement arrondi sur les côtés en avant, angles postérieurs arrondis, base assez fortement sinuée, disque lisse, sillonné au milieu, côtés assez largement déprimés; élytres largement échancrées à la base, qui est finement mais nettement marginée avec les épaules bien marquées, stries fines, lisses, intervalles plans, lisses, extrémité peu obliquement tronquée, presque arrondie en dehors; dessous et pattes concolores. — Ressemble beaucoup à *D. Eglandi*, de Boukhara, mais bien distincte par la tête un peu moins large, les yeux saillants,